



Miniguía de **Ornitología**

de la Comarca de la Hoya de Huesca

Miniguia d'Ornitolochía d'a
Comarca Plana de Uesca

Las aves en la Comarca



02

► ZEPA's

La Directiva de Aves (2009/147/CE) marca como objetivo preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves, designando Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Las ZEPA's que están ubicadas en el territorio de la Comarca de la Hoya de Huesca son:

- **ZEPA Sierra y Cañones de Guara**
- **ZEPA Sierras de Santo Domingo y Caballera y río Onsella**
- **ZEPA La Sotonera**
- **ZEPA Serreta de Tramaced**
- **ZEPA Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar**
- **ZEPA San Juan de la Peña y Peña Oroel**

Esto supone que prácticamente el 25 % del territorio de la comarca está considerada como ZEPA, de ahí la enorme importancia que tiene la conservación de estos hábitats en nuestro entorno.

► CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS EN ARAGÓN

El Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón (Decreto 49/1995, modificado por Decreto 181/2005) es la “Lista Roja”, una relación de especies de fauna y flora que se clasifican en 4 categorías: «**En peligro de extinción**», «**Sensible a la alteración de su hábitat**», «**Vulnerable**» y «**De interés especial**».

► HÁBITATS

La presencia de aves depende en gran medida del paisaje y del hábitat. El paisaje vegetal en las sierras exteriores del Pirineo consta sobre todo de rocas desnudas, vistosas paredes verticales, matorrales y bosques de quejigo. En el valle del Ebro, la mayor parte de los carrascales se han transformado en cultivos cerealistas y en campos de regadío con maíz, girasol y alfalfa. Los ríos son zonas acuáticas naturales y en la cola de algunos embalses crecen carrizo, sauces y chopos. Los bosques de ribera en los ríos son una parte singular del paisaje.

► USO DE LA MINIGUÍA


Denominación de la especie

Nombre común

Nombre científico

Aragonés

Clasificación de los 5 grupos de aves



Presencia temporal

Muchas especies de aves de la Comarca están presentes a lo largo de todo el año, otras son estivales, migrantes o invernantes. Bajo la ilustración de cada especie se presenta un gráfico de barras que indica su mayor o menor presencia por quincenas de cada mes.

Ejemplo:



Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

Cluxigüesos



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Presencia

El quebrantahuesos (100-115 cm, envergadura 260 cm) es quizás el ave más destacada del territorio comarcal. Muestra en vuelo unas alas alargadas y estrechas y una cola larga y puntiaguda. El color del cuerpo es anaranjado (a veces blanco), y las alas, la cola y la espalda son gris pizarra. Los jóvenes son negruzcos y no adquieren el plumaje de adultos hasta los siete años.

Lo más singular del quebrantahuesos es que su comida consta solo de huesos de animales muertos, los cuales trocea lanzándolos en vuelo desde las alturas. Construye su nido en acantilados inaccesibles, bien protegidos contra una climatología adversa porque su ciclo reproductor empieza ya en noviembre. La Hoya de Huesca cuenta con unas ocho parejas de esta especie. Se le puede ver por todo el Pirineo.

Alimoche

Neophron percnopterus

Boleta

El alimoche (60-70 cm, envergadura 160 cm) es conocido como “boleta” en Huesca. Es un buitre pequeño, de color blanco con las plumas del borde exterior del ala negras. Adquiere el color amarillo de la cara al alimentarse de heces de caballos y otros ungulados. Los jóvenes son mucho más oscuros.

Actualmente, el alimoche es el buitre más amenazado de Europa. Se alimenta de pequeños restos de animales muertos encontrados en el campo. Es un ave estival que visita la Comarca de marzo a septiembre. La Hoya de Huesca destaca por las 10-20 parejas que crían en las paredes de las sierras exteriores y en la Serreta de Tramaced por hospedar, después de la nidificación, a otras parejas con sus crías recién volados. Resulta más fácil verlo en las zonas de montaña que en la tierra llana.



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Presencia:

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Presencia:

Buitre leonado

Gyps fulvus

Güitre

El buitre leonado (95-105 cm, envergadura 250 cm) tiene alas muy anchas y aspecto de ser el ave más grande de la Comarca. Su silueta en vuelo se identifica a grandes distancias. Tiene colores marrón-canela, con plumas de vuelo negras y el cuello “desnudo” y blanco.

La Comarca de la Hoya de Huesca cuenta con grandes colonias en las paredes rocosas del Prepirineo. Pueden recorrer grandes distancias para buscar comida que obtienen de animales muertos. En la Hoya se ubican varios comederos, conocidos como “muladares”, autorizados por el Gobierno de Aragón, donde se pueden llegar a observar centenares de ejemplares que acuden a alimentarse, debido a las escasas posibilidades que tienen para obtener “carroña” por cualquier otro medio.

Milano real

Milvus milvus

Esparbero abadexero

El milano real (62-72 cm, envergadura 150 cm) se caracteriza por su larga y profundamente ahorquillada cola. Tiene un aspecto rojizo, con la cabeza clara y manchas blancas en las alas. Su vuelo es elegante y puede mover ambas alas y la cola de forma independiente. Su manera de mantenerse estable en el aire recuerda a una cometa.

Los lugares más frecuentados por el milano real son los campos, donde caza micromamíferos y busca carroña. Duerme, descansa y anida en pinares y en los bosques de ribera. La Hoya de Huesca es un lugar importante para la invernada de milanos reales que llegan del norte, principalmente desde Francia y Alemania. Se le puede observar con facilidad en las proximidades de pueblos y carreteras por toda la Comarca, sobre todo en invierno.



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Presencia: ■

Aguilucho lagunero

Circus aeruginosus

Alica de laberca



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Presencia: ■■■■■■■■■■■■

El aguilucho lagunero (48-55 cm, envergadura 110-125 cm) tiene un vuelo ligero con las alas en forma de V y una cola larga. El macho tiene tonos pardos y grises. La hembra y los jóvenes hasta tres años son de color marrón oscuro con la cabeza y los hombros blancos. Caza en vuelo, dejándose caer de vez en cuando.

Ligado al medio acuático, el aguilucho lagunero anida entre la densa vegetación de riberas y embalses. Se alimenta de micromamíferos y de aves. Es fácil verle cazar sobre campos de cultivo de secano y de regadío de la zona baja de la provincia. Utiliza como posadero el mismo suelo, a veces árboles. Después de la cría se juntan decenas de aguiluchos en dormideros, situados en carrizales. A finales de otoño, aumenta su población con la llegada de aves desde el norte.

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Falcón

La hembra del halcón peregrino (40-50 cm, envergadura 95-115 cm) es de mayor tamaño que el macho, como ocurre en todas las rapaces. Es un ave compacta, de colores grises (adultos) o marrones (jóvenes) con las alas puntiagudas y anchas en la base. Su bigotera, ancha y negra, le diferencia de otros halcones. Emite un grito de alarma, “quec-quec-quec-quec”.

El halcón peregrino es cazador de aves de pequeño y mediano tamaño. Vive en paredes rocosas y tiene un área amplia de caza. Hay más de diez parejas nidificantes en las sierras exteriores (Agüero, Riglos, Aniés, Vadiello, San Cosme . . .). Es sedentario, aunque aumenta su población en otoño cuando llegan aves desde el norte. Después de la cría se pueden ver aves en los postes de la luz y electricidad en la zona baja de la Comarca.



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Presencia:


Vencejo real

Tachymarptis melba

Falzeta de tripa blanca

El vencejo real (21 cm, envergadura 60 cm) presenta una silueta en forma de hoz y vuela con gran rapidez. Sus plumas son marrón oscuro, salvo en el vientre y en la garganta, que son blancas. Grita con frecuencia. Los vencejos solo descansan en tierra para criar, el resto de su vida lo pasan en aire.

Las colonias del vencejo real están situadas en acantilados rocosos de las sierras exteriores, p. e. en Agüero, Riglos, Aniés, Salto de Roldán y Vadiello. Cada colonia consta de cinco o diez parejas que suelen sobrevolar la zona por la mañana y antes del anochecer. Los primeros vencejos reales llegan a finales de marzo y los últimos se marchan a sus lugares de invernada, en África, en el mes de octubre.



Roquero solitario

Monticola solitarius

Solitario

El macho del roquero solitario (20,5 cm) luce un curioso color azul intenso, que es más oscuro en las alas y en la cola. La hembra es marrón. Ambos tienen un pico alargado. Tiene costumbre de posarse encima de grandes piedras, rocas o edificios donde es fácil de ver. Emite un canto desde un posadero o en vuelo ascendente para bajar en picado.

El roquero solitario prefiere zonas de roca desnuda, barrancos, paredes de conglomerados y areniscas. Puede construir el nido en grandes edificios (semi) abandonados. Muchos puntos donde crían están en las sierras exteriores, p. e. en Agüero, Riglos, Aniés, Roldán, Vadiello y los castillos de Loarre y de Montearagón, y en la Serreta de Tramaced, cerca de Piracés. Se puede ver el roquero solitario durante todo el año.



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Presencia:

Treparriscos

Tichodroma muraria

Pintaparez



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Presencia: 

El pequeño y atractivo treparriscos (16 cm) es la única ave que se desplaza horizontalmente y verticalmente por las paredes rocosas. Su vuelo se parece al de una mariposa. Tiene colores grises y negruzcos y en sus alas domina el color rojo vivo, que resalta cuando vuela. Su pico es alargado.

Desplazándose con asombrosa facilidad por las paredes, el treparriscos busca insectos y otros invertebrados en grietas y fisuras. No tiene miedo a los escaladores, que le encuentran con frecuencia trepando a pocos metros de distancia. Cría en el alto Pirineo, donde la comida escasea durante el frío invierno, por lo que entre octubre y abril baja a las sierras exteriores buscando un clima más suave. Lo podremos encontrar en acantilados y pequeñas paredes entre Agüero y Panzano.

Chova piquirroja

Pyrhonorax pyrrhonorax

Chola

La chova piquirroja (40 cm, envergadura 75 cm) es un córvido con plumas negras y con el pico y las patas de color rojo vivo. El pico es largo y curvado hacia abajo. Al volar separa sus largas plumas de vuelo, apareciendo una silueta con forma de “dedos”. Emite un reclamo agudo y prolongado, “kiioo-kiioo...”.

Existen colonias de chova piquirroja entre las rocas de las sierras exteriores y en la Serreta de Tramaced. Suelen anidar entre 2 y 10 parejas juntas. En invierno, llegan aves del alto Pirineo, escapando del frío. Entonces este ave se vuelve muy gregaria, pudiéndose observar grupos de hasta 300 ejemplares, un fenómeno único en Europa. Buscan alimentación en campos de cultivo en la zona baja de la Comarca y forman dormideros en las sierras exteriores.




Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Presencia: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grulla común

Grus grus

Gruda



La elegante grulla común (120 cm, envergadura 220 cm) tiene tonalidades gris plateado y se la puede ver desde grandes distancias. Los adultos lucen colores negro y blanco en el cuello, y rojo en la cabeza. Emite sonidos de largo alcance, chirriantes y trompeteantes.

La grulla vuela con el cuello extendido, en grupos. La disposición de su vuelo puede ser en círculos, en línea o en formación de “V”, cerca del suelo o a grandes alturas. Descansa en campos, lagos y embalses. Visita la Hoya entre finales de otoño y principios de primavera. Cerca de la localidad de Montmesa, en la alberca de Alboré, hay un gran dormidero con concentraciones de hasta 82.000 aves. Entre febrero y marzo migran hacia el norte de Europa. Resulta espectacular observar las salidas en grandes bandadas desde los campos de cultivo próximos.



Pato colorado

Netta rufina

Aneda roya

El pato colorado (55 cm) es el ánade buceador de mayor tamaño de nuestra avifauna y el único con una cabeza tan grande. El macho es inconfundible por su intenso color castaño-naranja de su cabeza y parte del cuello, y por su pico rojo. La hembra tiene colores blancos y marrones discretos. En vuelo se aprecia, en ambos, una franja alar, ancha y blanquecina.


Durante la primavera el pato colorado forma parejas en lagos y embalses donde la hembra construye el nido, escondido entre la vegetación. Mientras cuida de los huevos y de los pollos, el macho muda todas sus plumas y adquiere temporalmente un plumaje parecido al de la hembra. Algunas hembras crían cerca de Montmesa, en la orilla norte del embalse de la Sotonera. En la alberca de Loreto y en el embalse de Valdabra, el pato colorado es un visitante irregular.



Andarríos chico

Actitis hypoleucos

Biecadeta chicota



El andarríos chico (20 cm) es una limícola de patas cortas, de tonos gris-pardo y vientre blanco. Su vuelo es muy característico. Es el único que vuela bajo sobre el agua, dando aleteos rápidos alternados con cortos planeos y con las alas rígidas inclinadas hacia abajo. Emite un penetrante y repetido “jii-dii-dii-dii”.

Como todas las limícolas, el andarríos chico recorre la orilla de lagos y embalses en busca de pequeños insectos, crustáceos y otros invertebrados. Se le puede ver en solitario o en pequeños grupos. Es más abundante durante la migración, en abril-mayo y desde finales de julio hasta septiembre. A veces se esconde entre la vegetación. Es más fácil verle en la zona baja de la comarca, en el embalse de Valdabra y las albercas de Loreto y de Cortés.

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Zigüeña

La cigüeña blanca (100-115 cm, envergadura 180-220 cm) es un ave grande que, además, destaca por el contraste de sus plumas blancas y negras, y sus patas y pico de color rojo. En vuelo muestra una silueta con alas anchas, blancas y negras; con cuello, cabeza y partes inferiores blancas.

Los grandes nidos de la cigüeña blanca se construyen en edificios, postes, antenas y árboles maduros. La comarca cuenta con centenares de parejas que nidifican en la zona baja, con concentraciones en Huesca ciudad y Buñales. Los adultos ocupan su nido a partir de febrero. Después de la cría, en el mes de julio, se juntan hasta varios centenares de cigüeñas blancas en los campos de regadío de la comarca en busca de comida. Entonces empieza la migración a África, pero una parte de la población se queda todo el invierno aquí.



Meses: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Presencia: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


Abejaruco común

Merops apiaster

Abellerol

El abejaruco común (28 cm) luce colores tropicales que lo hacen inconfundible. Cuando descansa en una rama o en un cable telefónico tiene una pose vertical con larga cola y largo pico. En sus vuelos ondulados emite un reclamo que se escucha a gran distancia, “schrrruc-schrrruc”.

La alimentación del abejaruco consta de abejas y avispas que caza en vuelo y que puede ver incluso a 60 metros de distancia. Es muy sociable, cría en pequeñas colonias y migra en bandadas. Es un ave estival que llega en abril y que nos deja en septiembre. El abejaruco construye nidos en taludes y en cortadas arenosas, a menudo cerca de un río. Nidifica en muchos lugares de la zona baja de la Comarca, donde es fácil de ver, siendo especialmente abundante en la Serreta de Tramaced.




Oropéndola

Oriolus oriolus

Cagadaga

El macho de la oropéndola (24 cm) destaca por su color brillante amarillo que contrasta con el negro en cola y alas. La hembra tiene colores verdosos y ambos sexos se camuflan bien entre los árboles. Emite un característico canto, que le ha hecho popular en los pueblos.

Las copas de los árboles son el lugar favorito de la oropéndola. Allí se alimenta de grandes insectos y de algunas frutas. Es un ave común en los bosques de ribera y en las choperas de la parte baja de la Comarca. Allí se puede ver en vuelos ondulados, el macho detrás de la hembra, emitiendo su melancólico canto. Cuando deja de cantar, en julio, es más difícil de detectar. En septiembre migra a África y regresa en abril.



En esta miniguía aparecen **16 especies** **ornitológicas** destacadas de la Comarca, pero se pueden divisar muchísimas más. Las que aquí se presentan se han elegido por su singularidad, por su facilidad de avistamiento o por la importancia de este territorio para a su conservación.

DL HU-414/2016

Textos: Kees Wouttensen

Diseño: Disimil Estudio Creativo

Ilustraciones: Frits Jan Maas



hoya de huesca
Comarca Hoya de Huesca • Plano de Uesca

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
ARIA DE MEYO AMBIEN

C/ Berenguer, 2-4. 22002 Huesca
Tel. 974 233 030 • www.hoyadehuesca.es